

# Kanizsai Dorottya Kórház

Főigazgató: Prof. Dr. Bátorfi József



## Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály

**Osztályvezető:** Dr. Szabó Szilárd

**Cím:** 8800, Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.

**Tel:** 93/502-024, **Fax:** 93/502-064

**Email:** szuleszet@nkkorhaz.hu



### Tájékoztató a szülés előtt álló nők részére

Ön bizonyára felkészült a szülésre, és tájékozódott a szülés lefolyásáról, az esetleges beavatkozásokról. Ezek a beavatkozások az Ön és gyermeke(i) egészségének megőrzése érdekében történnek és a szülés biztonságát szolgálják. Elvégzésükhöz az Ön beleegyező nyilatkozatára is szükség van.

A szülőszobán történő felvétele után az alábbi vizsgálatokat végezzük el:

- ellenőrizzük a magzat szív működését,
- illetve úgynevezett belső vizsgálatot végzünk.

A belső vizsgálat a hüvelyen át történik, amelynek során megállapítjuk a méhszáj tágasságát és a burok állapotát. Mindezeket túlmenően vérnyomásmérést és vizeletvizsgálatot is végzünk.

A szülés előrehaladottságától függően az Önnel történt egyeztetés után kerülhet sor a szeméremszőrzet leborotválására és a beöntésre.

A vajúadás során gyakran ellenőrizzük a magzati szív működést kis kézi készülékkel, de szükség lehet a folyamatos ellenőrzésre is, egy, a hasfalra erősített műszer segítségével.

A szülés haladását, a méhszáj tágulását időközönként belső, hüvelyi vizsgálatokkal követjük.

Sok esetben szükségessé válik (anyai vagy magzati érdekből) a burok megrepesztése és a méhtevekenység renyhülése esetén Oxytocin infúzió adása, infúziós pumpa segítségével.

Néha előfordul, hogy a magzatvíz zöldesen elszíneződik, vagy a magzat szív működése kissé eltér a normálistól. Ilyen esetben folyamatosan ellenőrizzük a magzat állapotát, hogy kellő időben tudjunk beavatkozni az érdekében.

A szülés alatt lehetnek kellemetlen érzései, akár fájdalmai is. Ennek csökkentésére gyógyszeres (injekciós) keveréket alkalmazunk, illetve önbelégző készülék segítségével gázkeveréket (nitrogén-oxydul-oxygen 50-50 %-os keverékét, kéjgázt) lélegezhet be a méhösszehúzódások alatt, mindezeket csak abban az esetben, ha Ön óhajtja. Az ezekkel kapcsolatos tudnivalókat szülészete ismerteti Önnel.

A szülések többsége szülőágyon zajlik. Egyágyas szülőszobánkban együtt lehet azzal, akit választ. A kísérő a szülőszobán az általunk biztosított védőruhában lehet csak jelen. A műtőbe nem mehet be.

A vajúadás alatt - az Ön számára kényelmes - bármilyen testhelyzetet választhat.

Rendelkezésre áll nagy gumilabda, bordásfal a vajúadás könnyebbé tételére.

A magzat megszületésekor - amennyiben szükséges - gátmetszést végzünk. A gátseb és az esetlegesen keletkezett hüvelyfali sérülés ellátása helyi érzéstelenítésben történik. Igen ritkán sérülhet a végbél, vagy a húgyhólyag is. Ritkán előfordul, hogy a méhlepény, vagy a magzataburok nem távozik egészen. Ilyenkor kézzel, vagy műszerrel betapintunk a méh üregébe, és a bennmaradt részeket eltávolítjuk. A műtői heg ellenőrzése céljából hasonlóan járunk el akkor is, ha valakinek az előző szülése császármetszéssel végződött.

A legtöbb szülés zavartalanul zajlik. Az esetek egy részében az anya, vagy a magzat, vagy mindkettő veszélyhelyzete esetén műtői beavatkozás (császármetszés, fogóműtét, vakuum) válik szükségessé. Ezeket a műtéteket biztonságosan el tudjuk végezni a nap bármelyik szakaszában. Így

szövődmény (utóvérzés, a nemi szervek, vagy a környező szervek, vagy a magzat sérülése, gyulladás, bélműködési vagy sebgyógyulási zavar) csak nagyon ritkán fordul elő.

A **császármetszést** gerinc közeli érzéstelenítésben, vagy altatásban végezzük. Altatásra csak akkor kerül sor, ha Ön ragaszkodik ehhez, vagy a műtét sürgőssége miatt nincs idő a gerinc közeli érzéstelenítésre. Erről szükség esetén az érzéstelenítést végző (aneszteziológus) orvos ad részletes felvilágosítást. Ha sürgős beavatkozásra a szülés kitolási szakában van szükség, akkor a magzat gyors megszületését a magzat fejére helyezett haranggal, tompa fogóval segítjük. A magzat érdekében végrehajtott vákuumos szülés vagy a fogóműtét a magzat számára veszélytelen, a műtétek elvégzése kapcsán ritkán előfordul a hüvelyfal sérülése, melyet biztonságosan el tudunk látni.

Szükség esetén a szülés folyamán segítségül hívunk más szakorvost is. Bármilyen felmerülő kérdésre a szülőszoba személyzete készséggel ad további felvilágosítást. Intézetünkben 24 órás gyermekgyógyász (neonatólógus) szolgálat működik.

A fenti tájékoztatást elolvastam, azt megértettem, tudomásul vettem. Tájékoztattak arról, hogy a fentiekben csak a fontosabb kezelési módokat említették meg.

Módomban állt a szövődményekkel és a felmerülő kezelési eljárásokkal kapcsolatban további kérdéseket feltenni. Ezzel a lehetőséggel éltem, kérdéseimre részletes, kielégítő választ kaptam, azt megértettem, tudomásul vettem. További kérdésem nincs. Ennél részletesebb tájékoztatást nem igényelek.

A szükségessé váló vizsgálatok, beavatkozások elvégzéséhez hozzájárulok.

Nagykanizsa, 20..... év ..... hó ..... nap.

.....  
a felvilágosítást és/vagy műtétet  
végző orvos

.....  
a szülőnő, vagy törvényes képviselő

A törvényes képviselő írta alá, mert a szülőnő kiskorú, vagy

.....

A felvilágosítás ellenére sem egyezem bele a következőkbe, és ennek minden következményét vállalom:

.....

.....

.....

a szülőnő vagy törvényes képviselője

A törvényes képviselő írta alá, mert a szülőnő kiskorú, vagy

.....